

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 5, place Paul-Jamot - REIMS.

C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

SUPPLEMENT AU BULLETIN N° 7 d'AVRIL 1961

21 AVRIL 1961

INFORMATIONS

V I G N E

Rougeot parasitaire ou Brenner.-

Dans les secteurs habituellement exposés à la maladie, exécuter un premier traitement au stade 3 feuilles étalées.

Utiliser une bouillie cuprique, ou un fongicide à base de zinèbe ou d'un produit organo-cuprique.

Pyrale.-

L'apparition des larves commence à se manifester; il convient de surveiller les foyers habituels de ce ravageur; l'invasion étant très échelonnée, la gravité des attaques est souvent difficile à apprécier.

Traiter éventuellement dans le courant de la semaine du 24 au 30 Avril, en effectuant une pulvérisation copieuse à l'aide d'une bouillie à base de D.D.T. ou de parathion.

P.1.1.1

GRANDE CULTURE

INFORMATIONS

Pégomyie de la betterave.-

Dans certains secteurs du département de l'Aisne, les pontes ont été particulièrement abondantes ces derniers jours. Les conditions climatiques demeurant très favorables à l'évolution du parasite, des dommages très sérieux sont à craindre à partir du 30 avril.

Chaque fois que l'on constatera sur l'ensemble des quatre premières feuilles des pontes d'une moyenne supérieure à 8-10 oeufs, un traitement devra être appliqué dès l'apparition des premières mines c'est à dire très prochainement.

Utiliser l'un des produits figurant sur la liste publiée en début d'année.

Eviter d'intervenir sur betteraves devant être démariées aussitôt après, lorsqu'on met en oeuvre des produits susceptibles d'incommoder les ouvriers (esters phosphoriques en particulier).

Puceron noir.-

Les premières colonies de pucerons remarquées depuis une dizaine de jours sont fréquemment gênées par les précipitations; elles ont peu évolué et un traitement ne s'impose pas jusqu'à présent.

Dans les cultures devant être traitées contre la pégomyie, il y a intérêt, lorsque l'importance des colonies de pucerons le justifie, à utiliser un produit également actif contre ces derniers: parathions, diazinon, gusathion, endothion, diméthoate.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

B. PINEAU et A. GODIN

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytop sanitaire de REIMS,

P. CUISANCE